



BENCIDAMINA

Venta Bajo Receta
Industria Argentina

Fórmula

Cada gramo contiene: bencidamina clorhidrato 5 mg. Excipientes: palmito-estearato de polioxietilenglicol 180 mg; glicéridos etoxilados saturados 30 mg; triglicéridos saturados 30 mg; ácido cítrico monohidrato 2 mg; citrato de sodio dihidrato 4 mg; ácido benzoico 2 mg; agua purificada c.s.

Acción Farmacológica y Terapéutica: antiinflamatorio y antiséptico de acción tópica.

Indicaciones: vaginitis infecciosa (flora mixta y gardnerella vaginalis), traumática, actínica y senil.
Profilaxis pre y postoperatoria de cirugía ginecológica.

Precauciones y advertencias: el uso de la crema, sobre todo en forma prolongada, puede provocar fenómenos de sensibilización locales, en cuyo caso se procederá a interrumpir la aplicación tópica.

Se recomienda mantener la crema lejos del alcance de los niños.

Contraindicaciones: hipersensibilidad conocida hacia el fármaco.

Antagonismos y antidotismos: no se han descripto.

Efectos adversos: excepcionalmente puede provocar leve irritación vaginal en pacientes particularmente sensibles.

Posología: 1-2 aplicaciones diarias, según criterio médico.

Instrucciones para la aplicación:

1. Roscar la cánula en la boca del pomo, con el émbolo retirado.
2. Llenar la cánula con la crema, presionando el pomo desde su extremo inferior.
3. Retirar la cánula del pomo, e introducirla suave y profundamente en la vagina.
4. Presionar el émbolo hasta completar su recorrido.

Presentación: pomos de 30 g de crema, con 6 aplicadores descartables de 4 gr.

Fecha de última revisión: julio de 2007

Forma de conservación

- Conservar en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15 y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Dirección Técnica: Dr. Luis M. Radici – Farmacéutico.
MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD.
Certificado N° 43.213
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.
Boyacá 237 - Buenos Aires

E-0818-02 / D1036 / Act. 10/2009